

FRAGMENTA LICHENOLOGICA

Riunisco per comodità degli studiosi — raccogliendole dalle mie pubblicazioni in Riviste botaniche e in Opere varie e altre aggiungendone di inedite — le entità licheniche nuove da me trovate dal 1921 ad oggi. Le diagnosi sono ora tutte in latino: qualcuna delle meno recenti è stata, oltre che tradotta, ampliata.

Esse costituiscono l'intero contributo di entità nuove, italiane ed estere, trovate da lichenologi italiani, se si aggiungano due varietà e una specie del prof. E. SAMBO (1), dal tempo di JATTA ad oggi.

Di esse sono apparse nel « Catalogus lichenum universalis » di A. ZAHLBRUCKNER tutte quelle di cui l'Autore ha fatto in tempo a tener conto nella parte finora edita della sua Opera.

1. BLASTENIA DON-BOSCO Ceng. Sambo in « Licheni della Terra del Fuoco » raccolti dai Missionari Salesiani, Torino, 1926, pag. 44, tabula XV, fig. 7-11. (Cfr. Cat. Lich. Univ. Zahl., vol. VII, Abt. 1-10).

Thallus sub-ipophloeoides exilissimus effusus corticatus; gonidia protococcoidea minuta 8 μ . lata, 10 μ . longa, inter hyphis crassis esepatis inspersa; stratum sub-cortice hyphis minoribus et septatis instructum.

Apothecia lecanorina inspersa minutissima 0,1 mm. lata, margine thallino obscuro-rufescente demum evanescente; excipulo proprio bene evoluto; gonidiis hymenialibus parvis minimisque; paraphysibus cylindricis. Sporae octonae hyalinae distracto-dydymae tubulo axile junctae, 9 μ . longae 4 μ . latae; asci ventricosi numerosi.

Località. — In terra su resti di fanerogama erbacea con *Cladonia pyxidata* var. *neglecta*, Rio Carmen Sylva (Fuegia). Legit TONELLI 1910.

2. BUELLIA FAGNANOI Ceng. Sambo in l. c. pag. 46, Tab. I, fig. 1 et Tab. XV fig. 4-5.

Thallus albo-cinereascens continuus rimosus protothallo nigro limitante et interdum erumpente. Apothecia nigra primitus immersa, dein

(1) SAMBO E., *I licheni del M. Ferrato*. (Nuovo Giornale Botanico Italiano, n. s., vol. XXXIV, 1926).